

CATALOGUE

4

635

Cat.
Aud.

DES ARBRES,

ARBRISSEAUX ET ARBUSTES,

QUI se cultivent dans les PÉPINIÈRES de JEAN
AUDIBERT aîné, à Tonnelle, près Tarascon,
Département des Bouches-du-Rhône.

ACACIE, *Acacia*.

* — blanche, *a. alba*.

» — en arbre, *a. arborea*.

* — à épines d'ivoire, *a. eburnea*.

* — de Farnèse, *a. Farnesiana*.

* — de Malabar, *a. Lebeck*.

* — à tête blanche, *a. leucocephala*.

* — *a. Lophantha*.

* — à feuilles inégales, *a. suaveolens*.

ACHIT, *Cissus*.

— acide, *c. acida*.

ADÉLIE, *Adelia*.

* — *a. acitodon*.

AJONE, *Ulex*.

— d'Europe, *u. Europæus*.

AIRELLE, *Vaccinium*.

» — anguleuse, *v. myrtillus*.

— canneberge, *v. oxycoccus*.

— des marais, *v. uliginosum*.

ALIBOUFIER, *Stirax*.

— officinal, *s. officinalis*.

ALISIER, *Crategus*.

» — de Fontainebleau, *c. aria*.

2 variétés { à feuilles dentées.
à feuilles entières.

» — Aubépin, *c. oxyacantha*.

var. { fructu luteo.
flore pleno.

— à feuilles de poirier, *c. pyrifolia*.

» — du Canada, *c. Coccinea*.

» — ergot de coq, *c. crus-galli*.

» — azérolier, *c. azarolus*.
(3 variétés).

» — à fleurs rouges, *c. monogyna*.

» — à feuilles de tanasie, *c. vanacetifolia*.

» — à feuilles de saule, *c. salicifolia*.

AMANDIER, *Amygdalus*.

» — argenté, *a. orientalis*.

» — à fleurs doubles, *a. pumila*.

» — nain des indes, *a. nana*.

L 5

Amandier ordinaire, *a. communis*. (5 variétés).

» — pêcher, *a. persica*. (30 variétés).

var. *flore pleno*.

AMORPHA, *Amorpha*.

» — faux indigo, *a. fruticosa*.

ANAGYRE, *Anagyris*.

» — à bois puant, *a. foetida*.

— glauque, *a. glauca*.

ANDROMÈDE, *Andromeda*.

— caliculée, *a. caliculata*.

— de maryland, *a. mariana*.

— à fleurs axillaires, *a. axillaris*.

— à feuilles étroites, *a. angustifolia*.

— glauque, *a. glauca*.

ANONE (Corrossol) *Anona*.

— du Pérou, *a. cherimolia*.

ANSERINE, *Chenopodium*.

» — maritime, *c. maritimum*.

ANTHYLLIDE, *Anthyllis*.

» — argentée, *a. barba-jovis*.

* — à feuilles d'hermane, *a. hermanice*.

APALACHINE, *Prinos*.

— glabre, *p. glaber*.

ARALIE, *Aralia*.

— épineuse, *a. spinosa*.

ARBOUSIER, *Arbutus*.

» — busserole, *a. uva-ursi*.

— à panicules, *a. andrachne*.

» — fraisier en arbre, *a. unedo*.

ARCTOTIDE, *Arctotis*.

* — à grande fleur, *a. grandiflora*.

ARGAN, *Sideroxylon*.

» — doré, *s. tenax*.

ARGOUSIER, *Hippophaë*.

» — rhanmoïde, *h. rhanmoides*.

— du Canada, *h. canadensis*.

ARGUSE, *Meserschmidia*.

* — frutescente, *m. fruticosa*.

L 5

ARISTOLOCHE, *Aristolochia*.

† — à grande feuille, *a. siphoph*.

* — trilobée, *a. trilobata*.

ARMOISE, *Arthemisia*.

» — aurone, *a. abrotanum*.

* — argentée, *a. argentea*.

— du Portugal, *a. arborescens*.

ARROCHE, *Atriplex*.

— pourpier de mer, *a. halimus*.

ASCLEPIADE, *Asclepias*.

* » — à feuilles de saule, *a. fruticosa*.

ASTRAGALE, *Astragalus*.

— adragand, *a. tragacantha*.

AYLANTHE, *Aylanthus*.

» — de la Chine, *a. glandulosa*.

AZALÉE, *Azalea*.

— nudiflore, *a. nudiflora*.

AZÉDARACK, *Melia*.

» — des Indes, *m. azedarack*.

* » — toujours vert, *m. sempervirens*.

BACCHANTE, *Baccharis*.

» — de virginie, *b. halimifolia*.

» — à feuilles d'iva, *b. ivæfolia*.

BAGUENAUDIER, *Colutea*.

» — ordinaire, *c. arborescens*.

» — du Levant, *c. cruenta*.

* » — d'Éthiopie, *c. frutescens*.

BALSAMIER, *Amyris*.

» — polygame, *a. polygama*.

BANKSIE, *Banksia*.

* — à feuilles de bruyère, *b. ericæfolia*.

BAOBAB, *Adansonia*.

» — à feuilles palmées, *c. digitata*.

BASILIC, *Ocimum*.

* — frutescent, *o. gratissimum*.

BIDENS, *Bidens*.

* — à feuilles de sureau, *b. sambucina*.

BIGNONE, *Bignonia*.

» — en arbre *b. catalpa*.

† — orangée, *b. capreolata*.

† — griffe de chat, *b. unguicatis*.

†* — toujours verte, *b. sempervirens*.

† » — de virginie, *b. radicans*.

BOERHAVE, *Boerhavia*.

* — en arbre, *b. arborea*.

BOULEAU, *Betula*.

— blanc, *b. alba*.

— commun, *b. alnus*.

BROUSSONET, *Broussonetia*.

» — de la Chine, *b. papyrifera*.

(*mas. et femina*).

BRUYÈRE, *Erica*.

» — en arbre *e. arborea*.

» — à balais, *e. scoparia*.

— cendrée, *e. cinerea*.

— commune, *e. vulgaris*.

— herbacée, *e. herbacea*.

— de la Méditerranée, *e. mediterranea*.

— multiflore, *e. multiflora*.

— quaternée, *e. tetralix*.

BUGDELÈJE, *Bugdeleja*.

» — globuleux, *b. globosa*.

* — à feuilles de sauge, *b. salvifolia*.

BUGRANE, *Ononis*.

— frutescente, *o. fruticosa*.

BUIS, *Buxus*.

» — en arbre, *b. sempervirens*.

Buis. { à feuilles dorées.
variétés. { *Idem*, argentées
et panachées.

» — de Mahon, *b. balearica*.

» — nain, *b. fruticosa*.

BUPHTALME, *Buphtalmum*.

» — fruticuleux, *b. fruticosum*.

BUPLEVRE, *Buplevrum*.

» — frutescent, *b. fruticosum*.

* — épineux, *b. spinosum*.

CALICARPE, *Calicarpa*.

* — d'Amérique, *c. americana*.

CALICANTHE, *Calicanthus*.

— de virginie, *c. floridus*.

CAMARA, *Lantana*.

* — épineux, *l. aculeata*.

* — à colerette, *l. involocrata*.

CAMELÉE, *Cneorum*.

» — à trois coques, *c. triccoccum*.

* — poudreuse, *c. pulverulentum*.

CAMÉROPE, *Camærops*.

— naine, *c. humilis*.

CANTUA, *Cantua*.

* — fétide, *c. fœtida*.

CAPRIER, *Capparis*.

» — épineux, *c. spinosa*.

* — sans épines, *c. inermis*.

CARMENTINE, *Justicia*.

* — de ceylan, *j. adhatoda*.

* — à crochet, *j. echolium*.

* — écarlate, *j. coccinea*.

* — *j. gondarussa*.

* — à feuilles d'hyssope, *j. hyssopifolia*.

CARROUBIER, *Ceratonia*.

* — pain de s.-jean, *c. siliqua*.

CARTHAME, *Carthamus*.

* — frutescent, *c. salicifolius*.

CASSE, *Cassia*.

» — de Buenos-Ayres, *c. corymbosa*.

L

L

- * » Casse tomenteuse, *c. tomentosa*.
- A CÉANOTHE, *Ceanothus*.
- » — d'Amérique, *c. americanus*.
- » — d'Espagne, *c. hispanicus*.
- » *c. macrocarpus*.
- A CÉLASTRE, *Celastrus*.
- » † — grimpant, *c. scandens*.
- A * — d'Espagne, *c. hispanicus*.
- » * — à feuilles de buis, *c. buxifolius*.
- A CÉPHALANTHE, *Cephalanthus*.
- » — d'Occident, *c. occidentalis*.
- CESTREAU, *Cestrum*.
- » — du Chili, *c. parqui*.
- * — (galant de jour), *c. diurnum*.
- CHALEF, *Eleagnus*.
- » — de Bohême, *e. angustifolia*.
- CHARME, *Carpinus*.
- » — commun, *c. betulus*.
- CHENE, *Quercus*.
- » — d'Amérique, *q. Americana*.
- » — de Gramond, *q. Gramuntia*.
- » — kermès, *q. coccifera*.
- » — pédonculé, *q. pedunculata*.
- » — rouge, *q. rubra*.
- » — roure, *q. robur*.
- » — liège, *q. suber*.
- » — yeuse, *q. ilex*.
- CHÈVRE-FEUILLE, *Lonicera*.
- † » — des jardins, *l. caprifoliam*.
- † » — des haies, *l. periclymenum*.
- † — toujours vert, *l. sempervirens*.
- » — noir, *l. nigra*.
- » — des Alpes, *l. alpigena*.
- » *l. diervilla*.
- » — de Caroline, *symphoricarpos*.

- » Chèvre-feuille de Tartarie, *l. tartarica*.
- variétés. } à fleurs roses.
- } à fleurs blanches.
- » xylostéon, *l. xylosteum*.
- CHICORÉE, *Sunchus*.
- * — frutescente, *s. fruticosus*.
- CHICOT, *Gymnocladus*.
- » — bonduc, *g. canadensis*.
- CHIONANTHE, *Chionanthus*.
- » — de Virginie (arbre de neige), *c. virginicus*.
- CHRYSANTEME, *Chrysanthemum*.
- * — frutiqueuse, *c. fruticosum*.
- CISTE, *Cistus*.
- » — blanc, *c. albidus*.
- » — à feuilles de laurier, *c. laurifolius*.
- » — crépu, *c. crispus*.
- » — à feuilles d'alime, *c. halimifolius*.
- » — à fleurs roses, *c. roseus*.
- » — de Montpellier, *c. Montpellierensis*.
- » — à feuilles de sauge, *c. salisfolius*.
- CLAVAILLIER, *Zantoxylon*.
- » — à massue, *z. fraxinifolium*.
- * — à trois feuilles, *z. trifoliatum*.
- CLÉMATITE, *Clematis*.
- † » — à fleurs blanches, *c. vitalba*.
- † » — à flammes, *c. flammula*.
- » — à feuilles entières, *c. integrifolia*.
- † — à fleurs violettes, *c. viticella*.
- CLÉTHRE, *Clethra*.
- » — à feuilles d'aulne, *c. alnifolia*.

CLUTELLE, *Clutia*.

* — élégante, *c. pulchella*.

COBÉE, *Cobea*.

†* — grimpante, *c. scandens*.

COMPTONE, *Comptonia*.

— à feuilles de cétérac, *c. asplenifolia*.

CONYZE, *Coniza*.

— gluante, *c. viscosa*.

— soyeuse, *c. sericea*.

CORNOUILLIER, *Cornus*.

» — du Canada, *c. alba*.

— de la Floride, *c. florida*.

» — mâle, *c. mascula*.

— à panicules, *c. paniculata*.

— à grappes, *c. racemosa*.

» — rouge, *c. sanguinea*.

— soyeux, *c. sericea*.

— *c. sulcisa*.

CORONILLE, *Coronilla*.

» — des jardins, *c. hemerus*.

» — glauque, *c. glauca*.

COTELET, *Cytharexylum*.

* — cendré, *c. cinereum*.

* — à 5 étamines, *c. pentandrum*.

* — à tige anguleuse, *c. quadrangulare*.

COUDRIER, *Corylus*.

» — aveline, *c. avellana*.

— à fruit rouge, *c. fructu rubro*.

— à gros fruit, *c. fructu majore*.

CROTALAIRE, *Crotalaria*.

* — à feuille d'ebénier, *c. laburnifolia*.

CROTON, *Croton*.

— porte-suif, *c. sebiferum*.

CYPRES, *Cupressus*.

» — toujours vert, *c. semper-virens*.

» — à branches étalées, *c. expansa*.

Cypres à feuilles de thuya, *c. thuyoides*.

— à feuilles d'acacia, *c. disticha*.

CYTISE, *Cytisus*.

» — des Alpes, *c. laburnum*.

— à feuilles sessiles, *c. sessilifolius*.

* — faux cajan, *c. pseudocajan*.

— velu, *c. hirsutus*.

— noirâtre, *c. nigrescens*.

DAHLÉE, *Georgina*. (a)

* — à fleurs roses, *g. rosea*.

* — à fleurs jaunes, *g. lutea*.

* — blanche, *g. alba*.

* — à feuilles pinnées, *g. pinnata*.

DAPHNOT, *Daphne*.

» — garou, *d. gnidium*.

— à feuilles de laurier, *d. laureola*.

— gentil *d. mezereum*.

— blanc, *d. tartonraira*.

— des Alpes, *d. Alpina*.

DATTIER, *Phoenix*.

* — à palmes, *p. dactylifera*.

DÉCUMARIA, *Decumaria*.

— de Caroline, *d. barbara*.

DIRCA, *Dirca*.

— des marais, *d. palustris*.

DODONÉE, *Dodonea*.

* — visqueuse, *d. viscosa*.

DOLIQUE, *Dolichos*.

†* — frutescente, *d. lignosus*.

(a) Quoique ce genre à racines bulbeuses n'aye que des tiges annuelles, elles paraissent néanmoins frutescentes. Son feuillage et ses belles fleurs m'ont déterminé à le placer dans ce Catalogue.

DURANTE, *Duranta*.— de Plumier, *d. plumieri*.ERABLE, *Acer*.» — des champs, *a. campestris*.» — jaspé, *a. canadensis*.» — tomenteux, *a. tomentosum*.— de Crète, *a. cræticum*.» — à pattes d'oie, *a. laciniatum*.» — à feuilles de frêne, *a. negundo* (*mas. et femina*).» — de Montpellier, *a. monspessulanum*.» — plane, *a. platanoïdes*.» — sicomore, *a. pseudoplatanus*.» — de Virginie, *a. rubrum*.» — à sucre, *a. saccharinum*.» — de Tartarie, *a. tartaricum*.EUPHORBE, *Euphorbia*.* — à fleurs pourpres, *e. atropurpurea*.* — des Canaries, *e. canariensis*.FEVIER, *Gleditsia*.» — d'Amérique, *g. triacanthos*.» — sans épines, *g. inermis*.» — de la Chine, *g. horrida*.FIGUIER, *Ficus*.* — à feuilles d'arbousier, *f. benjamina*.» — ordinaire, *f. carica* (de 30 à 40 variétés).* — rampant, *f. pumila*.* — à feuilles étroites, *f. angustifolia*.* — à feuilles en cœur, *f. cordifolia*.FILAO, *Casuarina*.* — à feuilles de prêle, *c. equisetifolia*.* — élevée, *c. stricta*.FONTAINÈSE, *Fontanesia*.» — à feuilles de phylliréa, *f. phylliræoides*.FRAGON, *Ruscus*.» — piquant, *r. aculeatus*.» — en languettes, *r. hypoglossum*.— à grappe, *r. racemosus*.FRAMBOISIER, *Rubus*.» — cendré, *r. cæsius*.» — du Canada, *r. odoratus*.» — du Mont-Ida, *r. Idæus*.

variétés. { à fruits rouges.

{ *Id. blancs*.{ *Id. tardifs*.† » — sans épines, *r. inermis*.† » — ronce, *r. fruticosus*.† » — *id.* à fleurs doubles, *r. multiplex*.FRÊNE, *Fraxinus*.» — d'Amérique, *f. americana*.» — argenté, *f. argentea*.» — de Calabre, *f. monophylla*.» — noir, *f. nigra*.» — commun, *f. excelsior*.» — jaspé, *f. jaspidea*.» — doré, *f. aurea*.» — à fleurs, *f. ornus*.» — à feuilles de noyer, *f. juglandifolia*.— pendant, *f. pendula*.» — à feuilles de sureau, *f. sambucifolia*.FUCHSIE, *Fuchsia*.* — écarlate, *f. coccinea*.FUSAIN, *evonymus*.— d'Amérique, *e. americanus*.» — d'Europe, *e. europæus*.— à fleurs pourpres, *e. atropurpureus*.» — à larges feuilles, *e. latifolius*.— à verrues, *e. verrucosus*.

FUSTET, *Coriaria*.

» — des corroyeurs, *c. myrtifolia*.

GAINIER, *Cercis*.

» — à fleurs rouges, *c. siliquastrum*.

» (variété à fleurs incarnates).

— du Canada, *c. canadensis*.

GALÉ, *Myrica*.

— de Pensylvanie, *m. pennsylvanica*.

— à feuilles de chêne, *m. quercifolia*.

— piment royal, *m. gale*.

— cirier, *m. cirifera*.

GATILLIER, *Vitex*.

» — faux poivrier, *v. agnus castus*.

variétés. { à fleurs bleues.

{ *Id.* roses.

{ *Id.* blanches.

— lacinié, *v. laciniata*.

GENET, *Spartium*.

» — d'Espagne, *s. junceum*.

— à balais, *s. scoparium*.

» — épineux, *s. scorpius*.

— de Ténérif, *s. nubigenum*.

— purgatif, *s. purgans*.

— impliqué, *s. complicatum*.

GENÉVRIER, *Juniperus*.

» — commun, *j. communis*.

» — de Phénicie, *j. phœnicea*.

— sabine, *j. sabina*.

» — à feuilles aiguës, *j. oxycedrus*.

— de Virginie, *j. Virginiana*.

GÉRANION, *Geranium*

* — à bandes, *g. zonale*.

* — *g. marginatum*.

* — *g. peltatum*.

* — *g. cucullatum*.

* — écarlate, *g. inquinans*.

* — papillonacé, *g. papillonaceum*.

ℒ S

* GÉRANION, térébenthinacé,
g. terebenthinaceum.

* — éclatant, *g. fulgidum*.

* — à tiges tortueuses : *g. gibbosum*.

* — à feuilles palmées, *g. anemonefolium*.

GERMANDRÉE, *Teucrium*.

— frutescente, *t. fruticans*.

« — à feuilles de romarin,
t. cræticum.

— à feuilles de bétoune, *t. betonicum*.

GINGO, *Salysburia*.

— à deux lobes, *s. adiantifolia*.

GLOBULAIRE, *Globularia*.

» — frutescente, *g. alipum*.

GLYCINE, *Glycine*.

† » — frutescente, *g. frutescens*.

GOMPHRÈNE, *Gomphrena*.

* — fruticuleuse, *g. fruticosa*.

GOYAVIER, *Psidium*.

* — à fruits en poire, *p. pyrifera*.

GRENADIER, *Punica*.

» — ordinaire, *p. granatum*
(*varietas*).

» — *Idem.* à fleurs doubles,
p. g. flore pleno.

— nain, *p. nana*.

GRENADILLE, *Passiflora*.

† » — couleur de chair, *p. incarnata*.

† » — à fleurs bleues, *p. cærulea*.

† * — jaune, *p. lutea*.

* † — puante, *p. fœtida*.

* † — soyeuse, *p. holosericea*.

GREUVIER, *Grewia*.

* — d'Occident, *g. occidentalis* (à fl. violettes).

* — d'Orient, *g. orientalis*
(à fl. jaunes).

ℒ S

GROSEILLIER, *Ribes*.

- » — des Alpes, *r. alpinum*
 » — noir (cassis), *r. nigrum*.
 — de Virginie, *r. pendulinum*.
 » — à fruit rouge, *r. rubrum*.
 » (variété à fruits blancs).
 » — à maquereau, *r. uva-crispa*.

variétés. { à fruits oblongs.
 { à fruits violets.
 { à fruits blancs.

HARICOT, *Phaseolus*.

- † * — caracolles, *p. caracalla*.

HÉLIOTROPE, *Heliotropium*.

- * » — du Pérou, *h. peruvianum*.

HERMANE, *Hermannia*.

- * — lisse, *h. denudata*.
 * — à feuilles d'hyssope, *h. hyssopifolia*.

HÊTRE, *Fagus*.

- » — châtaignier, *f. castanea*
 » — des bois, *f. sylvatica*.

HORTENSE, *Hortentia*.

- » — du Japon, *h. japonica*.

HOUX, *Ilex*.

- » — épineux, *i. aquifolium*
 (var. à feuilles panachées).
 — *i. cassine*.

HYDRANGÉE, *Hydrangea*.

- frutescente, *h. arborescens*
 — glauque, *h. glauca*.

IF, *Taxus*.

- » — commun, *t. baccata*.

IVA, *Iva*.

- » — fruticuleux, *i. frutescens*.

JASMIN, *Jasminum*.

- † » — ordinaire, *j. officinale*.
 † » — d'Espagne, *j. grandiflorum*.
 * — des Açores, *j. azoricum*.
 » — à feuilles de cytise, *j. fruticans*.

L S

- * Jasmin d'Italie, *j. humile*.

- * » — jonquille, *j. odoratissimum*.

- » * — d'Arabie, *j. sambac*.

- * † — géniculé, *j. geniculatum*.

KETMIE, *Hibiscus*.

- » — des jardins, *h. syriacus*.

- var. { à fleurs doubles rouges.
 { *Id.* blanches.
 { à feuilles panachées.
 { à fl. simples blanches.
 { *Id.* incarnates.
 { *Id.* à .. violettes.

- * » — de Cayenne, *h. mutabilis. flore pleno*.

- * — à feuilles en coin, *h. cuneifolius*.

- * — élégante, *h. speciosus*.

- * — épineuse, *h. spinifer*.

KIGELLAIRE, *Kiggellaria*.

- * — d'Afrique, *k. africana*.

LAPULIER, *Triumphetta*.

- * — sinué, *t. lappula*.

LAURIER, *Laurus*.

- benjoin, *l. benzoïn*.

- » — commun, *l. nobilis*.

LAUROSE, *Nerium*.

- » — commun, *n. oleander*.

- » — (à fl.^{rs} roses simples.

- * » — var. à fl.^{rs} blanches.

- * » — (à fl.^{rs} doubles roses.

- * — odorant, *n. odoratum*.

LAVANDE, *Lavendula*.

- » — *l. spica*.

- » — *l. stœchas*.

- *l. multifida*.

LAVATÈRE, *Lavatera*.

- » — en arbre, *l. arborea*.

- * — à trois lobes, *l. triloba*.

LÈDE, *Ledum*.

- des marais, *l. palustre*.

LITHOSPERMUM, *Lithospermum*.

Lithospermum frutiqueux, *l. fruticosum.*

LIERRE, *Hedera.*

† — grim pant, *h. elix.*

LILAS, *Syringa.*

— de Perse, *s. persica.*

— à feuilles de troëne, *s. ligustrifolia.*

— varin, *s. sinensis.*

— ordinaire, *s. vulgaris.*

variétés. { à fleurs pourpres.

Id. à grandes fleurs.

Id. à fleurs blanches

LIQUIDAMBAR, *Liquidambar.*

— copal, *l. styraciflua.*

LISERON, *Convolvulus.*

* — tomenteux, *c. encorum.*

* — de Tenerif, *c. scoparius.*

LUZERNE, *Medicago.*

— en arbre, *m. arborea.*

LYCIET, *Lycium.*

* — d'Afrique, *l. afrum.*

— jasminoïde, *l. barbarum.*

— d'Europe, *l. europæum.*

MAGNOLIER, *Magnolia.*

— à grande fleur, *m. grandiflora.*

— glauque, *m. glauca.*

MAQUI, *Aristotelia.*

— du Chili, *a. macqui.*

MARRONIER, *Æsculus.*

— d'Inde, *c. hippocastanum.*

— à fleurs jaunes, *c. flava.*

— Id. à fleurs rouges, *c. pavia.*

— à grappe, *c. macrostachya.*

MAUVE, *Malva.*

* — à feuilles d'Erable, *m. acerifolia.*

— à feuilles étroites, *m. angustifolia.*

* — *m. miniata.*

MÉLALEUQUE, *Melaleuca.*

* — à feuilles de millepertuis, *m. hypericifolia.*

MÉLIANTHE, *Melanthus.*

* — pyramidal, *m. major.*

— puant, *m. minor.*

MÉNISPERME, *Menispermum.*

† — du Canada, *m. canadense.*

† — de Virginie, *m. virginicum.*

MENSELÉE, *Menzelea.*

* — rugueuse, *m. aspera.*

MICOCOULIER, *Celtis.*

— commun, *c. australis.*

— d'Occident, *c. occidentalis.*

— d'Orient, *c. Orientalis.*

MIMEUSE, *Mimosa.*

* — pudique, *m. pudica.* (sensitive).

MILLEPERTUIS, *Hypericon.*

— à odeur de bouc, *h. hirsutum.*

* — des Canaries, *h. canariensis.*

— *h. androsæum.*

MIRSINE, *Mirsine.*

* — d'Afrique, *m. africana.*

MORELLE, *Solanum.*

— faux piment, *s. pseudocapsicum.*

— de Buenos-ayres, *s. bonariense.*

† — grim pante, *s. dulcamara.*

* — de Sodôme, *s. sodomæum.*

* — bordée, *s. marginatum.*

* — pinnatifide, *s. pinnatifidum.*

* — à feuilles lancéolées, *s. lanceolatum.*

* — épineuse, *s. muricatum.*

* — à feuilles de bette, *s. betaceum.*

* — des Canaries, *s. vesper-tilio.*

L S

MURIER, *Morus*.» — noir ou des dames, *m. nigra*.» — de Constantinople, *m. constantinopolitana*.— rouge, *m. rubra*.» — blanc, *m. alba*.— du Canada, *m. canadensis*.MYRTE, *Myrtus*.» — commun, *m. communis*.variétés. { à larges feuilles.
 { à fleurs doubles.* — d'Espagne, *m. bœtica*.NÉFLIER, *Mespilus*.» — d'Allemagne, *m. germanica*.variétés. { à gros fruits.
 { sans pépins (*abortiva*)— du Japon, *m. japonica*.» — buisson ardent, *m. pyracantha*.» — cotonneux, *m. cotoneaster*.NERPRUN, *Rhamnus*.» — alaterne, *a. alaternus*.» — purgatif, *r. catharticus*.— bourdaïne, *r. frangula*.— des Alpes, *r. alpinus*.» — des teinturiers, *r. insectorius*.» — jujubier, *r. ziziphus*.» — porte-chapeau, *r. paliurus*.NEZ-COUPÉ, *staphilea*.» — patenôtrier, *s. pinnata*.» — de Virginie, *s. trifoliata*.NOYER, *juglans*.» — commun, *j. regia* (*varietas*).— blanc, *j. alba*.— noir, *j. nigra*.— à feuilles de frêne, *j. scæxinifolia*.— à fruits tardifs, *j. serotina*.

L S

OLIVIER, *Olea*.» — d'Europe, *o. europæa*.* — du Cap, *o. fragrans*.ORANGER, *Citrus*.* » — commun, *c. medica*.* — (bigarade, *c. acida*).* — var. cédra, *c. cedra*.* — poncire, *c. tuberosa*.* » — sauvageon (d'Asie),
c. aurantium.* — de Portugal, *c. olysiponense*.* — var. bergamotte, *c. bergamium*.* — bouquetier, *c. multiflorum*.* — chinois, *c. sinensis*.

(variété à feuilles de myrte).

ORME, *Ulmus*.— d'Amérique, *u. americana*.» — des champs, *u. campestris*.» — à liège, *u. suberosa*.» — à larges feuilles, *u. latifolia*.OSEILLE, *Rumex*.— frutescente, *r. lunaria*.PARKINSET, *Parkinsonia*.* — épineux, *p. aculeata*.PASSERINE, *Passerina*.— velue, *p. hirsuta*.PÉRIPLOQUE, *Periploca*.† » — grimpante, *p. græca*.— à feuilles étroites, *p. angustifolia*.PEUPLIER, *Populus*.» — blanc, *p. alba*.

(variété à feuilles lobées).

» — de Caroline, *p. angulata*.» — beaumier, *p. balsamifera*.» — noir, *p. nigra*.— à fe.^{lles} en cœur, *p. cordifolia*.— tremble, *p. tremula*.

Peuplier du Canada, *p. canadensis*.

— de Suisse, *p. helvetica*.

» — de Virginie, *p. virginiana*.

» — d'Italie, *p. fastigiata*.

PHILICE, *Philica*.

* — en épis, *p. spicata*.

* — bruyère du Cap, *p. ericoides*.

PHLOMIDE, *Phlomis*.

— fruticuleuse, *p. fruticosa*.

* — queue de lion *p. leonurus*.

PHORMIUM, *Phormium*.

— de la nouvelle Zélande, *p. tenax*.

PIMENT, *Capsicum*.

* — cerise, *c. cerasiforme*.

PIN, *Pinus*.

— noir, *p. abies*.

— d'Ecosse, *p. balsamea*.

— du Mont-Liban, *p. cedrus*.

— méleze, *p. larix*.

» — maritime, *p. maritima*.

» — de Corse, *p. altissima* (*laricio*).

— à feuilles d'if, *p. picea*.

» — à pignons, *p. pinea*.

— des bois, *p. sylvestris*.

— mugo, *p. montana*.

— du lord Weimouth, *p. strobus*.

PISTACHER, *Pistacia*.

— de Narbonne, *p. narbonensis*.

» — du Levant, *p. vera*.

» — térébinthe, *p. terebinthus*.

» — lentisque, *p. lentiscus*.

PITTORE, *Varonia*.

— à feuilles d'aulne, *v. alni-folia*.

PLAQUEMINIER, *Diospyros*.

» — d'Italie, *d. lotus*.

— de Virginie, *d. virginiana*.

PLATANE, *Platanus*.

» — d'Occident, *p. occidentalis*.

» — à main découpée, *p. acerifolia*.

PLOCAME, *Plocama*.

* — pendante, *p. pendula*.

POIRIER, *Pyrus*.

— à feuilles d'arhousier, *p. arbutifolia*.

» — amelanchier, *p. amelanchier*.

» — ordinaire, *p. communis* (60 variétés).

var. *flore pleno*.

» — pommier, *p. malus* (30 variétés).

» — sans fleurs, *p. dioica*.

» — admirable, *p. spectabilis*.

— (odorant) à fleurs semidoubles, *p. coronaria*.

» — coignassier, *p. cydonia* (2 variétés).

» — torminal, *p. torminalis*.

— hybride, *p. hybrida*.

» — épineux, *p. spinosa*.

— de Sibérie, *p. sibirica*.

POIVRE, *Piper*.

* — *p. media*.

POMADÉRIS, *Pomaderris*.

* — sans pétales, *p. apetalas*.

PORTE-COLLIER, *Osteospermum*.

* d'Ethiopie, *o. moniliferum*.

POTENTILLE, *Potentilla*.

» — fruticuleuse, *p. fruticosa*.

PRUNIER, *Prunus*.

* — du Canada, *p. canadensis*.

» — marasquin, *p. padus*.

— à grappe, *p. racemosa*.

— du Portugal, *p. lusitanica*.

» — laurier cerise, *p. lauro-cerasus*.

» Prunier odorant, *p. mahaleb.*
 » — abricotier, *p. armeniaca* (de 6 à 12 variétés à fruits).
 variétés. { à fruits noirs.
 { à feuilles panachées.
 » — cerisiers, *p. cerasus* (de 20 à 30 variétés).
 (variété à fleurs doubles.).
 » — merisier, *p. avium.*
 » — tardif, *p. c. semperflorens.*
 » — des bois, *p. c. sylvestris.*
 » — (variété à fleurs doubles).
 * — du Mississipi, *p. c. americana.*
 » — ordinaire, *p. domestica.*
 » — à fruits pendans, *p. cerasifera.*
 » — épineux, *p. spinosa.*
 PSORALÉE, *Psoralea.*
 — glanduleuse, *p. glandulosa.*
 » — bitumineuse, *p. bituminosa.*
 PTELÉE, *Ptelea.*
 » — à trois feuilles, *p. trifoliata.*
 RAISINIER, *Coccoloba.*
] — à feuilles sagittées, *c. sagitata.*
 ROBINIER, *Robinia.*
 » — visqueux, *r. viscosa.*
 » — sans épines, *r. inermis.*
 — de Sibérie, *r. caragana.*
 » — à fleurs roses, *r. hispida.*
 » — blanc, *r. pseudo-acacia.*
 — *r. chamlagu.*
 ROMARIN, *Rosmarinus.*
 » — commun, *r. officinalis.*

ROSAGE, *Rhododendrum.*
 — d'Amérique, *r. maximum.*
 à fleurs violettes, *r. ponticum.*
 ROSIER, *Rosa.*
 » — blanc, *r. alba.*
 » — de Hollande, *r. centifolia maxima.*
 » — gros pompon, *r. centifolia minor.*
 — sauvage, *r. arvensis.*
 — canelle, *r. cinnamomea.*
 — des montagnes, *r. collina.*
 — églantier, *r. eglanteria.*
 — de Provence, *r. gallica.*
 (variété à fleurs panachées.)
 — musqué, *r. moschata.*
 » — à guirlande, *r. pendulina.*
 » — pompon, *r. burgundiana.*
 » — à feuilles de pinprenelle, *r. pinpinellifolia.*
 — rouillée, *r. rubiginosa.*
 » — toujours vert, *r. sempervirens.*
 — épineux, *r. spinosissima.*
 » — de Cochinchine, *r. purpurea.*
 * » — de Bengale, *r. bengalensis.*
 » — de tous les mois, *r. semperflorens.*
 » — de Damas, *r. damascena.*
 » — de provins, *r. provincialis.*
 * — de la Chine, *r. sinensis.*
 — mousseux, *r. muscosa.*
 » — jaune, *r. sulphurea.*
 — à bractées, *r. bracteata.*
 — des Alpes, *r. alpina.*
 — velu, *r. villosa.*
 ROUVET, *Osyris.*
 » — blanc, *o. alba.*

RUE, *Ruta*.

- * — à feuilles ailées, *r. pinnata*.
- » — commune, *r. graveolens*.
- » — des montagnes, *r. montana*.

SAINFOIN, *Hedysarum*.

- * — frutiqueux, *h. fruticosum*.

SAUGE, *Salvia*.

- * — éclatante, *s. formosa*.
- dorée, *s. aurea*.

SAULE, *Salix*.

- » — blanc, *s. alba*.
- » — à feuilles d'amandier, *s. amygdalina*.
- » — pleureur, *s. babylonica*.
- » — marsault, *s. caprea*.
- odorant, *s. pentandra*.
- nain, *s. fusca*.

..... *s. viminalis*.

— osier rouge, *s. purpurea*.

» — osier jaune, *s. vitellina*.

SAVONIER, *Kœluteria*.

— paniculé, *k. paullinoïdes*.

SCHINUS, *Schinus*.

* — d'Amérique, *s. molle*.

SERISSE, *Serissa*.

* — puante, *s. fœtida*.

SIDA, *Sida*.

..... *s. mollis*.

SOLENDRE, *Portlandia*.

* — à grande fleur, *p. grandiflora*.

SOPHORE, *Sophora*.

— du Japon, *s. japonica*.

— à petites feuilles, *s. microphylla*.

SORBIER, *Sorbus*.

» — ordinaire, *s. domestica*.

» — des oiseleurs, *s. aucuparia*.

» — de Laponie, *s. hybrida*.

LS

SOUDE, *Salsola*.

— maritime, *s. fruticosa*.

SPIRÉE, *Spiræa*.

» — crénelée, *s. crenata*.

» — à feuilles de sorbier, *s. sorbifolia*.

» — à feuilles de viorne, *s. opulifolia*.

» — à feuilles de millepertuis, *s. hypericifolia*.

» — à fl. incarnates, *s. carnea*.

— lisse, *s. lævigata*.

» — à feuilles de saule, *s. saicifolia*.

STATICÉE, *Statice*.

» — frutescente, *s. monopetala*.

* — en arbre, *s. arborea*.

STERCULIER, *Sterculia*.

» — de la Chine, *s. platani-folia*.

STRAMOINE, *Datura*.

* — en arbre, *d. arborea*.

SUMAC, *Rhus*.

— copal, *r. copalinum*.

» — des corroyeurs, *r. coriaria*.

» — fustet, *r. cotinus*.

» — vénéneux, *r. toxicodendrum*.

» — à la gale, *r. radicans*.

» — velu, *r. villosum*.

..... *r. typhinum*.

— à feuilles étroites, *r. viminalis*.

— à trois lobes, *r. trilobum*.

» — de Virginie, *r. virginiana*.

SUREAU, *Sambucus*.

— du Canada, *s. canadensis*.

» — à feuilles découpées, *s. laciniata*.

» — noir, *s. nigra*.

» — à grappe, *s. racemosa*.

SYRINGA, *Philadelphus*.

* — commun, *p. coronarius*.

LS

Syringa nain, *p. nanus*.
 TAMARIS, *tamaris*.
 » — de Narbonne, *t. gallica*.
 — d'Allemagne, *t. germanica*.
 THUYA, *Thuya*.
 » — de la Chine, *t. orientalis*.
 — d'Occident, *t. occidentalis*.
 TILLIEUL, *Tillia*.
 » — d'Europe, *t. europæa*.
 — d'Amérique, *t. americana*.
 — à larges feuilles, *t. pubescens*.
 — argenté, *t. argentea*.
 — rouge, *t. corallina*.
 TROENE, *Ligustrum*.
 » — commun, *t. vulgare*.
 TULPIER, *Liriodendrum*.
 — de Virginie, *t. tulipifera*.
 VERBESINE, *Verbesina*.
 * — fruticuleuse, *v. fruticosa*.
 VERVEINE, *Verbena*.
 * — odorante, *v. triphylla*.
 VIGNE, *Vitis*.
 — en arbre, *v. arborea*.
 ¶ » — à feuilles découpées, *v. laciniosa*.
 ¶ » — *v. vinifera*
 (de 20 à 30 variétés).

¶ » — *v. labrusca*.
 ¶ » — vierge, *v. hederacea*.
 VINETIER, *Berberis*.
 » — du Canada, *b. canadensis*.
 » — commun, *b. vulgaris*.
 — de la Chine, *b. sinensis*.
 — à feuilles de houx ; *b. ilicifolia*.
 VIORENE, *Viburnum*.
 » — mansienne, *v. lantana*.
 » — laurier thym, *v. thymus*.
 » — obier, *v. opulus*.
 — boule de neige, *v. o. sterilis*.
 — à feuilles de prunier, *v. prunifolium*.
 VIPERINE, *Echium*.
 * — à feuilles étroites, *e. strictum*.
 * — *e. giganteum*.
 * — à feuilles de pain de sucre, *e. plantagineum*.
 * — frutescent, *e. fruticosum*.
 VOLKAMÈRE, *Volkameria*.
 * — sans épines, *v. inermis*.
 ZANTHORIZÉ, *Zanthoriza*.
 — à feuilles de céleri, *z. apiifolia*.

OBSERVATIONS.

JE ne saurais assigner un prix fixe aux différentes espèces d'ARBRES et ARBUSTES de ce Catalogue ; la force et la rareté des individus le font changer tous les ans. Certaines espèces qui sont dans ce moment très-rares, et qui, venant dans la suite à se multiplier, peuvent être passées à un prix moindre que celui qui aurait pu être fixé auparavant.

Nota. Les espèces marquées d'un * sont celles dont l'établissement se trouve abondamment pourvu. * désigne les ARBRES ou ARBUSTES qui ne peuvent résister à ce climat, et qui, par conséquent, ont besoin d'être renfermés pendant l'hiver. † désigne les espèces sarmenteuses propres à garnir les Pavillons et Tonnelles.

Les personnes qui ne pourront se transporter dans mes Pépinières et qui voudront m'honorer de leur confiance sont invitées à faire leurs demandes aux environs du mois d'Octobre, afin que je puisse d'avance leur communiquer les différens prix. Elles peuvent être assurées du soin que l'on prendra au sujet de l'emballage, et de l'attention que l'on aura à mettre des étiquettes à chaque espèce, avec divers synonymes, toutes les fois qu'on le désirera.

Certaines personnes ne connaissant que très-peu les arbres, sont en peine pour savoir les espèces qui conviendraient le mieux à leurs plantations; je pourrai, autant que mes connaissances me le permettront, leur donner des renseignemens à ce sujet, pourvu que l'on aye le soin de me désigner la qualité et la situation du terrain que l'on se propose de planter,

En outre de l'assortiment des espèces indigènes et exotiques de ce *Catalogue*, l'on trouvera dans la même Pépinière toutes les meilleures espèces d'arbres à fruits, qui ont chacune leur nom et qui se trouvent rangées par ordre de maturité dans un *Catalogue* séparé.

(51)

P. S. Plusieurs Propriétaires se fiant aveuglement à la bonne foi de certains Jardiniers, les envoient chez moi pour chercher des Arbres à fruits ; ceux-ci conduits par une spéculation frauduleuse, au lieu de suivre les ordres qui leur ont été donnés, (*) s'en vont chez la plupart des Pépiniéristes de nos environs, qui leur donnent les Arbres à quelques sols meilleur marché, et qui, au lieu de suivre exactement les notes qui leur sont remises, arrachent indistinctement des espèces quelconque, ou suppléent par d'autres la plupart de celles qu'ils n'ont pas. Le fait est si constant, que plusieurs personnes qui, comme je viens de le dire, avaient été trompées par leurs jardiniers, voyant au bout de quelques années que parmi les Arbres qu'elles avaient fait planter, il ne se trouvait presque aucune des espèces qu'elles avaient demandées, ne manquèrent pas de m'en faire des reproches, croyant que c'était moi qui les avaient fournis. Je répondis que je ne me rappelais en aucune manière de leur avoir fait des fournitures à l'époque qu'elles me marquaient, et que ma mémoire et mes journaux ne pouvaient que très-difficilement me tromper. Ces personnes s'informèrent alors encore mieux où ces Arbres avaient été pris, leurs Jardiniers furent alors contraints d'avouer qu'ils les avaient pris ailleurs.

(*) D'autres pour avoir sujet de dire qu'ils y sont venus, ne prennent dans mes Pépinières qu'une partie de ce qu'il leur faut et vont chercher le restant ailleurs.

56 *Arbres, Arbustes, Plantes, Oignons, etc.*

STAPELIA.	STAPELIA.
1 hirsuta.	velue.
2 grandiflora.	à grandes fleurs.
STERCULIA.	STERCULIA.
1 platanifolia.	à feuilles de platane.
THEA.	THE.
1 bohea.	bou.
2 ——— viridis.	——— vert.
TIGRIDIA.	TIGRIDIE.
2 pavonia.	à grandes fleurs.
TRITOMA.	TRITOMA.
1 media.	moyen.
VINCA.	PERVENCHE.
1 rosea.	rose ou du Cap.
2 ——— flore albo.	——— à fleurs blanches.
VOLKAMERIA.	VOLKAMERIA.
1 Japonica.	du Japon.
YUCCA.	YUCCA.
2 filamentosa.	filamenteux.

GODEFROY tient encore la Collection

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:
Conservatoire et Jardin botaniques, Genève

Digital version sponsored by:
C. A. Wimmer

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0)